

## Recomendaciones cribado VIH

### 1) ENFERMEDADES DEFINITORIAS DE SIDA → PRUEBA VIH SIEMPRE

1. Cáncer cervical (invasivo)	16. Linfoma de Burkitt
2. Candidiasis esofágica	17. Mycobacterium avium complex o Mycobacterium kansasii (diseminada o extrapulmonar)
3. Candidiasis de bronquios, tráquea o pulmones	18. Mycobacterium, otras especies, diseminada o extrapulmonar
4. Candidiasis diseminada	19. Neumonía recurrente
5. Criptococosis (extrapulmonar)	20. Neumonía por Pneumocistis jirovecii
6. Criptosporidiosis intestinal crónica	21. Retinitis por CMV
7. Encefalopatía asociada a VIH	22. Sarcoma de Kaposi
8. Enf CMV (no afecte a hígado, bazo o nódulos)	23. Síndrome de emaciación por VIH
9. Herpes simple con úlceras crónicas, bronquitis, neumonitis o esoagitis	24. Toxoplasmosis cerebral
10. Septicemia recurrente por Salmonella	25. Mycobacterium tuberculosis (extrapulmonar o pulmonar)
11. Histoplasmosis (diseminadas o extrapulmonar)	26. Leishmaniasis visceral (kala-azar)
12. Isosporiasis intestinal crónica	
13. Leucoencefalopatía multifocal progresiva	
14. Linfoma inmunoblástico	
15. Linfoma cerebral primario	

### 2) ENFERMEDADES ASOCIADAS PREVALENCIA VIH NO DIAGNOSTICADO >0'1% PRUEBA VIH SIEMPRE

1. ITS	8. Trombocitopenia o leucocitopenia idiopática >4 sem
2. Linfoma maligno	9. Dermatitis seborreica/exantema
3. Cáncer/displasia anal	10. Enfermedad neumocócica invasiva
4. Displasia cervical	11. Fiebre sin causa aparente
5. Herpes zóster	12. Candidemia
6. Hepatitis B o C	13. Leishmaniasis visceral
7. Síndrome mononucleósico	

### 3) SE CONSIDERA PROBABLE PREVALENCIA DE VIH NO DIAGNOSTICADO >0'1% OFRECER PRUEBA VIH

1. Cáncer de pulmón primario	10. Pérdida de peso injustificada
2. Meningitis linfocítica	11. Linfadenopatía idiopática
3. Leucoplasia vellosa oral	12. Candidiasis bucal idiopática
4. Psoriasis grave o atípica	13. Diarrea crónica idiopática
5. Síndrome de Guillain–Barré	14. Insuficiencia renal crónica idiopática
6. Mononeuritis	15. Hepatitis A
7. Demencia subcortical	16. NAC
8. Enfermedad del tipo esclerosis múltiple	17. Candidiasis
9. Neuropatía periférica	

**4) NO DETECTAR INFECCIÓN POR VIH PUEDE TENER IMPLICACIONES NEGATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS AUNQUE LA PREVALENCIA DE VIH <0'1%  
OFRECER PRUEBA VIH**

1. Enfermedades que requieren una terapia inmunosupresora agresiva:
  - Cáncer
  - Trasplante
  - Enfermedad autoinmune tratada con terapia inmunosupresora
2. Lesión cerebral primaria ocupando espacio
3. Púrpura trombocitopénica idiopática/trombocítica

**5) OTRAS INDICACIONES → OFRECER PRUEBA VIH**

1. Parejas sexuales de personas infectadas por el VIH
2. Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres
3. Antecedentes de usuarios de drogas por vía parenteral
4. Trabajadoras sexuales y clientes
5. Internos instituciones penitenciarias
6. Oriundas de un país con alta prevalencia del VIH
7. Parejas que vayan a dejar de utilizar preservativo
8. Hijos nacidos de mujeres infectadas por el VIH
9. Personas que solicitan una prueba del VIH
10. Personas que que padezcan una ITS
11. Mujeres embarazadas
12. Exposición accidental profesional
13. Antes de dar profilaxis post-exposición